

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-9-7-68 812046

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 93 - JUIN 1968/17

OIDIUM DU PECHER

La maladie a été favorisée par les conditions atmosphériques perturbées de la fin mai. Il convient de limiter son développement par des traitements renouvelés à l'aide de poudrage de soufres fluents ou de pulvérisations de soufres micronisés, de soufres dispersés, de dinocap, de bouillie sulfocalcique, d'oxythioquinox.

TORDEUSE ORIENTALE

Dans tous les vergers (pêchers et abricotiers) où des pousses minées ont été décelées, il est nécessaire de traiter ; la lutte contre la Tordeuse orientale pour être efficace demande le renouvellement de la protection des fruits. Un premier traitement sera réalisé 5 semaines avant la date présumée de la récolte (R), un deuxième et troisième traitement seront nécessaires à 12 jours d'intervalle, soit :

1er traitement : date R moins 40
2ème traitement : date R moins 28
3ème traitement : date R moins 16

Utiliser Azinphos, Carbaryl, D.D.T., Fenitrothion, Mevinphos, Oléoparathion, Parathion, Phosalone, Medathion, en respectant les délais légaux d'emploi.

Cette série de traitements sera également utile pour prévenir les dégâts de l'Anarsia.

CAPNODE

Il est indispensable de prévenir les dégâts de cet insecte sur abricotier, pêcher, prunier, cerisier, en traitant le sol par arrosage (ou poudrage) avec une solution d'HCH ou de Lindane.

TAVELURE POIRIER - POMMIER

Des attaques importantes apparaissent dans de nombreux vergers.

Les conditions climatiques de fin mai et début juin vont aggraver la maladie.

Dans les vergers contaminés, poursuivre les traitements.

CARPOCAPSE

Le relèvement actuel des températures rend nécessaire un traitement dans les vergers de poiriers et de pommiers.

LA SESIE

Le réseau de piégeage fait apparaître un vol important. La ponte se poursuit et les premières éclosions sont proches.

Dans les vergers envahis un traitement avec un ester phosphorique : Parathion, devra être réalisé dès le 10 juin et avant le 16 juin.

Il est capital de traiter soigneusement et abondamment le tronc et les charpentières.

ACARIENS

L'araignée r. jaune vient de se manifester; la population d'araignée rouge est parfois importante.

Appliquer un acaricide dans les vergers où les dégâts se développent.

L.L. TROUILLON - M. BEZUT

CULTURES MARAICHERES DE PLEIN CHAMP (1)

A la faveur des récentes pluies, diverses maladies ont pu faire leur apparition.

ALTERNARIA DE LA TOMATE

Effectuer à la prochaine précipitation un traitement avec un des produits suivants : Manèbe, Mancozèbe, Folcid, etc...

BOTRYTIS DU FRAISIER

Nous rappelons que les produits suivants sont efficaces contre le botrytis : Phaltane, Captane, Captafol, Dichlofluanide.

ROUILLE DE L'ASPERGE

Cette maladie ayant fait son apparition vers le 15 mai, des traitements doivent être exécutés. Utiliser un des produits suivants : Manèbe, Mancozèbe, Zirame, Ferbame, Thiocyanodinitrobenzène, etc...

P. CHRESTIAN - J. LAVY

L'Inspecteur de la Protection des végétaux : P. BERVILLE

(1) - L'avis précédent n° 92 (3ème supplément du 20 mai 1968) n'a pu être envoyé en temps utile; ce dont nous nous excusons. Nous en faisons une diffusion tardive que nous joignons à l'avis n° 93, lequel n'est qu'un rappel des traitements précédemment recommandés.

Tirage du 6 juin 1968